

## Dénomination du médicament

**LACRIGEL, gel ophtalmique  
Carbomère**

## Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que LACRIGEL, gel ophtalmique et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser LACRIGEL, gel ophtalmique ?
3. Comment utiliser LACRIGEL, gel ophtalmique ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LACRIGEL, gel ophtalmique ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE LACRIGEL, gel ophtalmique ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

**Classe pharmacothérapeutique : SUPPLEANCE LACRYMALE, code ATC : S01XA20**

LACRIGEL contient une substance active, le carbomère.

Ce médicament est un gel pour l'œil. Il est utilisé pour traiter la sécheresse de l'œil.

Il humidifie et lubrifie temporairement la surface de l'œil.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LACRIGEL, gel ophtalmique ?

**N'utilisez jamais LACRIGEL, gel ophtalmique :**

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### **Avertissements et précautions**

#### **Précautions d'emploi**

- vous ne devez pas toucher votre œil avec l'embout du tube.
- ne pas laisser le tube débouché après emploi.
- tout tube entamé doit être utilisé dans un délai d'un mois.
- vous ne devez ni injecter, ni avaler ce médicament.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

### **Enfants et adolescents**

Sans objet.

### **Autres médicaments et LACRIGEL, gel ophtalmique**

Si vous utilisez un collyre en même temps que LACRIGEL, gel ophtalmique vous devez espacer les utilisations de 15 minutes.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

### **LACRIGEL, gel ophtalmique avec des aliments, boissons**

Sans objet.

### **Grossesse et allaitement**

Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, au cours de la grossesse ou de l'allaitement, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Si après avoir utilisé ce gel, vous ressentez une gêne au niveau des yeux ou si votre vision se trouble, vous ne devez pas conduire un véhicule ou utiliser une machine. Ces effets s'atténuent au bout de quelques heures.

### **LACRIGEL, gel ophtalmique contient <{nommer le/les excipient (s)}>**

Sans objet.

### 3. COMMENT UTILISER LACRIGEL, gel ophtalmique ?

Pour une bonne utilisation du gel certaines précautions doivent être prises :

- se laver soigneusement les mains avant de procéder à l'application,
- éviter le contact de l'embout avec l'œil ou les paupières,
- instiller 1 goutte par œil en regardant vers le haut et en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas,
- pratiquer 3 ou 4 instillations oculaires par jour,
- refermer le tube aussitôt après utilisation et le conserver dans son emballage d'origine.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

#### **Si vous avez utilisé plus de LACRIGEL, gel ophtalmique que vous n'auriez dû**

En cas de surdosage, rincer au sérum physiologique stérile.

#### **Si vous oubliez d'utiliser LACRIGEL, gel ophtalmique**

Sans objet.

#### **Si vous arrêtez d'utiliser LACRIGEL, gel ophtalmique**

Sans objet.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde :

- Allergie à l'un des composants du gel (irritation, rougeur), il faut en avertir votre médecin.
- Des réactions d'intolérance à l'un des composants du médicament peuvent apparaître très rarement, telles que irritations, picotements, et œdème des paupières.
- Un trouble visuel passager peut survenir après l'application du gel. Ce trouble, dû à la consistance du gel, disparaît une fois que le produit est bien réparti à la surface de l'œil.

#### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

### 5. COMMENT CONSERVER LACRIGEL, gel ophtalmique ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le conditionnement extérieur. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne pas mettre au réfrigérateur.

Ne pas congeler.

A utiliser dans un délai d'un mois après ouverture du tube.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

### 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

#### **Ce que contient LACRIGEL, gel ophtalmique**

· La substance active est :

Carbomère (carbopol 980 NF)..... 2 mg  
Pour 1 g de gel.

· Les autres composants sont : cétrimide, sorbitol, hydroxyde de sodium, eau pour préparations injectables.

#### **Qu'est-ce que LACRIGEL, gel ophtalmique et contenu de l'emballage extérieur**

Ce médicament se présente sous forme de gel ophtalmique.

Tube de 5, 10 ou 15 g.

#### **Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché**

##### **LABORATOIRES EUROPHTA**

"LES INDUSTRIES"  
2, RUE DU GABIAN  
98000 MONACO

#### **Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché**

##### **LABORATOIRES EUROPHTA**

"LES INDUSTRIES"  
2, RUE DU GABIAN  
98000 MONACO

#### **Fabricant**

##### **DR GERHARD MANN CHEM. - PHARM FABRIK GMBH**

BRUNSBÜTTELER DAMM 165-173  
13581 BERLIN  
ALLEMAGNE

## **Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

## **La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :**

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

## **Autres**

Sans objet.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).